

PRZYGOTOWANIE DO SKOPII GOPP (GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO)

Każde badanie przy użyciu aparatu do RTG wymaga skierowania. Pacjent powinien posiadać przy sobie również dowód osobisty w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

W badaniu podaje się doustnie środek cieniujący siarczan baru (popularnie zwany barytem). Związek ten posiada właściwość pochłaniania promieniowania rentgenowskiego. W aparacie rentgenowskim CLISIS oprócz uzyskania serii zdjęć radiologicznych, możliwe jest także uzyskanie podglądu wizyjnego (radioskopii). Jest to szczególnie cenne w diagnostyce zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego. Badaniu kontrastowe żołądka polega na podaniu środka kontrastowego, w celu uwidocznienia kształtu żołądka, fałdów błony śluzowej, perystaltyki, oceny przełyku i zdiagnozowania ewentualnych patologii.

Przygotowanie do badania:

- ❖ badanie kontrastowe górnego odcinka przewodu pokarmowego powinno być wykonywane na czczo,
- ❖ pacjent w dniu poprzedzającym badanie nie powinien jeść także kolacji lub powinien zjeść wcześniej lekki posiłek wieczorny,
- ❖ w noc poprzedzającą badanie pacjentowi nie wolno spożywać żadnych posiłków ani przyjmować płynów,
- ❖ w dniu badania pacjent nie powinien palić papierosów, zwiększa to bowiem czynność wydzielniczą i perystaltyczną przewodu pokarmowego,
- ❖ przed badaniem pacjent powinien zgłosić lekarzowi prowadzącemu przyjęte w danym dniu i dobie poprzedzającej leki oraz inne środki o działaniu farmakologicznym,
- ❖ należy zdjąć biżuterię, zegarek, pasek i inne metalowe przedmioty.